

Disertación

Hablar de las relaciones mutuas de las Inflamaciones gastro intestinales, y las razones mas probables sobre la diferencia Sintomatologica de las llamadas Púlses. Leida en la clase de Clinica p.^a el B.^o Dr. Federico Garcia Virego =



11
Christman

1870
The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Executive Committee.
The names are given in alphabetical order of the surnames.
The names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Executive Committee are given in alphabetical order of the surnames.
The names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Executive Committee are given in alphabetical order of the surnames.

20

The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Executive Committee.

5

Señores... necesaria sería la suficiencia
 y experiencia de un Hippocrates, la suma
 peripatética y destreza de Galeno, agilidad
 práctica y conocim.^{tos} de Novalis y Winstanley;
 para llenar en algún tanto los deberes a
 que en esta mañana se me destina. Empero
 la indulgencia de mis circunstantes y tal vez
 una favorable acogida de mi ilustrado Cate
 drático, me animan a coordinar del mejor
 modo posible el tropel de ideas que en mi
 semi-enagenada mente se aglomeran, al
 considerar la demostración de la Prop.^{ta} 9.^a
 se me ha designado. Empresa ardua a la
 verdad y que a la resignación más de
 cidida le arriedraria el hablar de una
 materia cuasi sin límites, pues esto con
 el todo de la economía animal.

Hablaré de las relaciones mutuas

de las inflamaciones gastro intestinales
y las razones mas probables sobre la
diferencia sintomatologica de las lla-
madas Fiebre, es el objeto de mi dis-
tacion. Por lo que juzgo indispensable
conocer con la mayor exactitud los or-
ganos o aparato de que se va a tratar
y sus relaciones en estado fisiologico;
sin cuyo preliminar es inaccesible
el otro extremo, conocerlos en estado Pa-
tologico, ya idiopatica ya simpatica
mte

El tubo digestivo o canal intestinal
que por las innumerables e interesan-
tes funciones que desempeña merece
la mas escrupulosa atencion y minu-
cioso examen. Situado desde la boca
al ano extremos o aberturas general
mte conocidas, su longitud seis o siete
veces mas ^{mayor} ~~larga~~ que la del indivi-

duo a g.^o pertenece, los intestinos ocu-
pan casi toda la totalidad de la cabi-
dad abdominal, estan doblados muchas
veces sobre si mismos: principian en el
fílolo y concluyen en el ano, la diferen-
cia en el grueso de esta porción del
canal alimenticio le hace dividirse en
muchas partes las que tienen nombres
diferentes. Los primeros intestinos son
mas delgados y se llaman así; ademas
cada uno en particular se denominan,
1.^o Duodeno, 2.^o yeyuno, 3.^o ileon, en la
longitud absoluta ^{en mucho mayor} que la de los ultimos
llamados intestinos gruesos a saber
ciego, colon, y recto; los que casi no for-
man mas que una quinta parte de
la longitud total de el mismo canal.
La masa de los intestinos esta supe-
ta a la columna vertebral y a las
partes inmediatas por medio de

un doble de el Peritoneo yamado
mesenterio.

El estomago primer organo que
debo describir, pues ocupa el primer
lugar en la antedicha proporcio¹⁰, situa
do en la parte sup.^a de la cavidad abdo-
minal en la region epigastrica e ipocon-
driaca izquierda, por delante corresponde
a las ultimas costillas falsas, a el higado,
y a las paredes abdominales por detras
al pancreas y a la aorta, por arriba al
higado y al diafragma, por abajo al
arco del colon, por la izquierda al
bazo y por la d^{ra}. al higado; su figura
semejante a un cono encorbado de
d^{ra}. a izquierda, cuya base corres-
ponde a la izquierda y el vertice
a la derecha: En cara o plano su-
perior inclinado hacia adelante,
en cara o plano inf.^r inclinada

hacia atrás, en borde anter. o gran
 corvadura del estomago, que recibe
 la insercion del gran epiploon, en
 borde posterior o pequeña corvadura
 que recibe el pequeño epiploon. En es-
 tremidad gruesa vuelta a la izquier-
 da que corresponde al bazo; en peque-
 ña extremidad vuelta a derecha y co-
 rresponde al intestino duodeno. En
 se advierten ademas dos orificios uno
 sup.^o llamado Cardias, que se continua
 en el esofago y corresponde a la
 parte media y sup.^o de la extremi-
 dad gruesa del estomago, y otro in-
 ferior llamado pilorico que se conti-
 nua con el duodeno. Estructura y
 vasos un numero de tunicas igual a
 las del esofago entran en la comp.^o
 del estomago, la ester.^o de la cap.^a

de las seras es una prolong.^{on} de el^o
peritoneo, la muscular cuyas fibras
a manera de bandas carnosas estan pu-
estas al rededor de la extremidad gruesa
o fondo del estomago, y la mucosa que
tapisa los organos de este aparato, su
superficie inter.^a continuam.^{te} humed.
decida p.^a el fluido mucoso es de color
rojo salpicado de manchas arula-
das, esta superf.^a inter.^a presenta mu-
chas arrugas y son el resultado de las
contracciones de la tunica muscular,
tambien se ven alli unas vellosidades
sitio comun donde se reñunen los del
estomago y las aberturas multiplicad.^{as}
siendo las mas los orificios de los
vasos absorbentes, y las otras corres-
ponden a los folículos mucosos si-
tuados en esta tunica; entre estas

arrugas ó pliegues hay una muy considerable en la estremidad inf.^{ra} de la viceria con el nombre de valvula Pilorica formada de la mucosa y un rodete fibroso, forma circular y algunos reconocen fibras carnosas.

Hedra ya la descrip.^{on} del estomago tocaré muy de pass sus usos ó bien las funciones q^{ue} ejerce: dando una rapida ojeada sobre sus simpatias con diferentes sistemas y organos. Bien sabidos deben ser á todos los que se dedican á la facultad medica los numerosos usos de esta viceria resultando de su cumplimiento los fenomenos mas importantes de la digestion. Luego q^{ue} los alimentos se introducen en la boca y medio de los agentes que al efecto

obran en nuestra economía, precedi-
endo la deliberac.^o de la voluntad y
mor.^{to}, cuando conocemos la nece-
sidad de reparar nuestras continuas
pérdidas y socorrer nuestras necesida-
des, el cerebro y cerebelo segun la
opinión gral de los Fisiólogos -
organos que presiden el 1.^o a la
voluntad y el 2.^o a el mor.^{to} segun
la dir.ⁿ del sistema nervioso; así
es que al momento de cumplir con
esta necesidad, tan íntimamente liga-
da con nuestra existencia, cuales
la de tomar los alimentos llevar-
los al organo preparado primi-
tivamente para ellos (si se puede
llamar así), haciendolos mas actos
para que otros organos cuyas fun-
ciones son mas delicadas, puedan

obrar mejor sobre ellos y aun dis-
 ponerlos a otra accion mas esen-
 cial y minuiciosa; se pone en accion
 la boca y las diferentes partes jigosa^{da}
 que contribuyen a esta func.^o de tri-
 turar los alimentos, los que despues
 de la deglusion pasan p.^o el esofago
 al estomago: esto refiero las circum-
 stancias y causas de este fenomeno p.^o
 no separarme del principal objeto. La
 espuestos a la acc.^o de este organo re-
 civen varias modificaciones y se
 forma una sustancia homogenea, par-
 dusca lactescente llamada quimo, pro-
 pia para pasar p.^o el orificio pils-
 rico, omito las questionnes que en la
 referida ^{funcion} ~~question~~ se han suscitado.
 Claro es que conocida la estructu-
 ra y posicion de este organo es-
 tan patentes con los q.^o esta en relac.^o

i Por ventura dejará de haber va-
los absorbentes, ramificaciones ner-
viosas y musculosas V? Que fácilmente
nos demostrarán cuando hablemos de su
estado morbo: mas ahora siguiendo el
metodo propuesto describiré los ya refe-
ridos dobles del canal intestinal que
siendo todos uno mismo y diferencian-
dose solo en la posición estructural
mas idonea p.^a de desempeñar sus funciones
en este conjunto armonioso. I.^o El Duodeno
situado en la reg.¹⁰ epigástrica desde el
Pilor a la segunda vertebra lumbar for-
mando muchas corbaduras, está en conec-
sion con el colon y el hígado por de-
lante con el pancreas y la vena
cava inf.¹⁰; y p.¹⁰ detras, a la dra. con la
vesicula de la hiel y el riñon del
mismo lado, a la izquierda con
el pancreas y los conductos coledoco

y pancreatico su figura prolongada
cilindrica. Este intestino que se puede
considerar un segundo estomago muy dis-
tinto de los otros de su clase, ya por su
situacion fuera del peritoneo ya por su
amplitud su facil dilatabilidad el gran
número de sus cordaduras gran número
de valvulas conniventes de que está
guarnecido su int.^o por la prodigiosa
cantidad de vasos quíloros que salen
de el, y sobre todo p.^o se derraman
en su cavidad los jugos viliar y pan-
creatico; en el duodeno p.^o su disp.ⁿ y es-
tructura se advierte ser mas lento el
curso de la materia alimentaria y mas
prolongada su permanencia á fin-
de q.^o este por mas tiempo sujeta-
a la accion de estos liquidos este
intestino que cae fuera del peri-
toneo para poder dilatarse hasta

igualar en grueso al estomago, sus
corvaduras dependen de los organos in-
mediatos, la multitud de valvulas q.
hay en su int.^{te} al mismo tiempo q.
aumentan los oram.^{tos} dan mas exten-
sion a su superficie y hacen que
pueda nacer de alli un numero con-
siderable de vasos linfaticos destina-
dos a chupar el quilo separado de la
parte esccrementicia de los alimentos
por la accion de los jugos que en el
derraman los conductos remanidos del
higado y pancreas; El yeyuno situa-
do en la region umbilical debajo del
arco del colon, encima del ileon, de-
tras de las paredes abdominales, delante
del mesenterio y la columna verte-
bral. El ileon situado en la re-
gion hipogastrica debajo del yeyuno
encima de la vejiga y recto de

tras de las paredes abdominales de
 lante de la columna vertebral y me-
 venterio. Estos intestinos forman ellos
 casi las tres cuartas partes de la longi-
 tud total de las vias digestivas, siendo
 mas estrechos que el duodeno son me-
 nos dilatables por que el peritoneo
 que forma su tunica exterior cubre
 con ella toda su superficie a excep.^{no}
 del borde posterior por el cual pene-
 tran en el sus vasos y nervios, por
 medio de este borde estan fijos en
 el mesenterio, ligadura membrana-
 rosa formada p.^a una duplicatura
 del peritoneo ut retro, la que soste-
 ne los vasos y los nervios que van
 a parar al yeyuno e ileon, e impide
 que se amiden y previene su
 imbaginacion. Se retarda la marcha

de la materia alimenticia por las
corbaduras del tubo intestinal cuya
multitud de circuitos hace q^d se pro-
longue lo bastante la permanencia
de los alimentos q^a q^e el quilo es
primido p^r las contracciones peris-
tálticas de los intestinos se presen-
tan a las vasos imbutos de los
vasos linfáticos q^d verifican la ab-
sorción. Despojada enteramente la ma-
teria alimenticia de la parte nutri-
tiva que contenia para del ileon
al ciego situado en la fosa iliaca
Dra debajo del colon ascendente
y debajo del ileon, su figura espe-
cie de culo de saco de forma irre-
gular y cuyo grueso es mucho ma-
yor que el del colon e ileon con
los q^d se continua, ofrece ademas

un apéndice vermiforme de cua-
tro o cinco dedos de largo que
sale de su parte inf.^a; El colon
toma su origen de la valvula ce-
cal, sube despues por la region lum-
bar derecha hasta el higado luego
camina a lo largo de la gran cor-
vadura del estomago de la cual
esta separado p.^a el gran epiploon
hasta la parte inmediata del
vazo, desciende a la region lumbar
izquierda delante del riñon del mis-
mo lado hasta la p.^a sup.^a de la
sacro en donde se termina, de
aqui resultan cuatro porciones que
tienen nombres diferentes; la pri-
mera que esta a la dra. se lla-
ma colon ascendente o porcion
lumbar dra. la segunda arco del

colon transverso, la 3.^a que está
a la izquierda, colon descend.^{te} o por
ción lumbar izquierda, la 4.^a que de
la fosa iliaca izquierda se termi
na en el recto, colon iliaco o cese del
colon: sus conexiones; el colon as
cendente se extiende desde el ciego
a la vejiga de la hiel, corresponde
p.^o delante a los intestinos delgados
y p.^o detrás al musculo cuadrado y al
riñon dno. y p.^o dentro a la g.^a del
mesenterio, el arco del colon se extiende
desde las inmediaciones de la vejiga
de hiel a la extremidad gruesa del
estomago corresponde p.^o arriba
a este mismo p.^o abajo a los inte
stinos delgados, p.^o delante al gran
epiploon, y p.^o detrás al mesenterio.
El colon descend.^{te} se extiende del

de las inmediaciones del varo a la
fosa iliaca d^{ra}, corresp.^{da} por de
lante al yeyuno, al musculo cua
drado y al riñon izquierdo y p^{te}
dentro al mesenterio. La S del colon
se extiende desde el principio de la
fosa iliaca izq.^{da} hasta la p^{te} sup.^{da}
del sacro ~~ultima de las~~ formando
muchas corbaduras. El recto ultimo
de los gruesos forma la terminacion
del canal intestinal, está situado —
en la escabac.^{on} de la pelvis y se
extiende desde el fin de la S. del
colon al ano; por detras corresponde
al sacro del cual ocupa toda la
cara ant.^{ra}; por delante a la vej
ga en el hombre y a la matriz
en la mujer. Abreviare bastante
los usos a q.^{ue} están destinados

2
estos intestinos. En el pan de Leon
el flego hay una valvula desti-
nada a impedir q^{la} la sustancia ali-
menticia o mas bien materia excre-
menticia retroceda al continuar
por estos intestinos, tambien dis-
puestos a hacerlo permanecer mas
tiempo p.^a q^{la} los vasos absorbentes
acaben de extraer la parte nutriti-
va. Hechas las materias puramente
fecales se disminuyen los absor-
bentes del ciego hasta el recto, se
espesan y endurecen, se forman
los excrementos en el colon siendo
impelidos despues hacia el recto
p.^a la accion peristaltica, donde
se acumulan hasta que sinti-
endo la necesidad de expelerlos
se ponen en acc.^{on} los musculos

los V^{os} que contribuyan a esta fun-
cion, que se efectua a beneficio de
las maceradas. de las lagunas del
recto. Finalizada la ligera descrip.^{to}
de este ap.^{to} y sus func.; paso a la
2.^a p.^{te} que es hablar sobre las re-
laciones mutuas de en estado Pato-
logico. Inflamacion es el cum.^{to} de
propiedades vitales en el organo don-
de reside, sus predisposiciones y
causas pueden ser muchas. obran
do unas mediata y otras inmediata-
mente, no deteniendome en enume-
rarlas pues estas pueden ser to-
do lo que esta en contacto, en
relac.^{on} con nosotros y ~~quede~~ ~~esta-~~
to. de inflamacion casi siempre
se manifiesta p.^o medio del dolor
calor rubor y tumef.^{on} anadi

endose á estos síntomas locales otros
generales, la intensidad del dolor se
rá en razon de la mayor ó menor
sensibilidad del organo afecto
de la densidad de su tejido, ba
riando su sensacion segun sea
la naturaleza de la inflama.^o
siendo en unas acre y urente, y
en otras suave y aliturna &c.
El calor y rubor tienen sus varie
dades, estando la sensibilidad or
ganica muy exaltada hay un
acumulo de vitalidad, los vasos
capilares se ponen turgentes y se
llenan de sangre arterial, la ru
bicundez será de color purpureo
y el calor ardte; si el color es
mas palido parece que los va
sos contienen mas sangre se

7.
nosa y de consiguiente el calor es
menor y de consiguiente las fuer-
zas vitales se hayan disminu-
das, así es que a la presión de
el dedo sobre el tumor se des-
nuda la rubicundez inflamatoria
presentándose luego al momento
que cede aquella, en esta se distingue
la de carácter dinámico. La tumefac-
ción es mayor o menor con relación al te-
jido del órgano, estando en esta mis-
ma razón la afluencia humoral de la
parte inflamada, notorio es aquel aforis-
mo de Hipócrates ubi stimulus ibi affluen-
tia tumefacción varia con relac.^{no} al ca-
racter de la inflamación, y organizac.^{no}
de la parte inflamada. Se circunscribe
en ciertos límites algunas veces, otra-
no, es regular o desordenada o ter-
mina en una especie de abceso es

tendido, ó forma tuberculo, pustulas &c.
Unas veces acomete á un solo sitio, otras
ocupa diversos, separados unos de otros;
de aqui el origen de los exantemas con-
fluente y discretos; se hallan tambien
síntomas locales de las flecmasías re-
lativos á las funciones de los órganos
afectos unas veces suprimiendo al
principio aquellas, luego haciendose
crescivas, otras veces no efectuandose
sus funciones. Síntomas gñales. La
calentura en algunas flecmasías es
inseparable, en unas se presenta en
su rigor, en otras no se observa, el
tipo de esta casi siempre es conti-
nuo ó remitente y mas si tiende
la enfermedad á la supuración, la
digestion rara vez deja de alterarse;
en la mayor parte de las flecma-
sías se haga con la complicación

gástrica, aumentando la fuerza de los síntomas, la circulac.^{on} las mareas se altera lo que demuestra las variaciones del pulso, la resp.^{on} en algunas inflamaciones tambien se altera e igualmente las secreciones ó exhalaciones de los órganos distantes de la parte afectada. La nutricion casi siempre se aumenta en el sitio donde se fija la fleemasia, interin se estenuan las partes inmediatas. Continuaría esta digresion hablando de la terminac.^{on} de las fleemasias si lo permitiera el tiempo, mas ya es indispensable entrar á esplanar segun este á mis alcances el tema de mi proposicion. La inflam.^{on} del estomago, gastritis, es la primera de que voy á tratar; en la teoria de la inflam.^{on} en gen.^{al} he dicho

q.º al momento q.º una viciosa se
inflama se hace un centro de
fuercion a donde corren los líquidos
con mayor afluencia, así es, que el
estomago luego q.º está afecto ya
haya producido esta af.º cual
quier causa predisponente o oca-
sional mite o activa, determi-
nante &c.º se alteran sus funciones,
alteradas estas aquellos materia-
les que prepara participan de
aquella novedad, todos los organos
que concurrieron a perfeccionar
la funciòn con sus respectivos
acciones tambien se alteran y sin-
patizan segun la intensidad de
la primera af.º aquellas glan-
dulas dispuestas a elaborar y
modificar aquellas sustancias q.
unos vasos que bien los pe-

demos considerar como vehiculos de-
tinados a conducir líquidos que sirven
para nutrir y alimentar los órga-
nos, y aun ellos mismos disfrutan
asimilando y convirtiendo en su pro-
pia sustancia, reparando de este
modo sus continuas pérdidas, aque-
llos materiales que ya han sufrido
preparaciones mas esquisitas y esen-
ciales en los diferentes órganos y
sistemas a cuya acc.^o se han suge-
tado: Pues si es una verdad incon-
testable que sin digerir y alimen-
tarnos no podemos vivir lo que
prueba la demacracion y flacci-
des cuando permanecen alterad.
p.^o algun tiempo las funciones
digestivas, i cuanto mas patente
será el que padeciendo el esto-
mago padescan tambien las

154
demás partes cuyas relaciones son
tan íntimas, mutuas y reciprocas?
pues siendo los intestinos unos mis-
mos una superficie continua que
solo se diferencian en la disposic.^{ón}
que cada uno tiene en particular
para desempeñar las funciones á
q.^{ue} estan destinados? Será posible
q.^{ue} padeciendo una parte no pade-
ca la q.^{ue} tan íntimamente está unida
con ella misma con tan mutuas de-
pendencias entre si, no bastarán
los hechos prácticos, la misma ex-
periencia y aun la razón á conven-
cernos de esta verdad? Si un orga-
no que diría mucho mas de los in-
testinos que ellos mismos entre
si y cuyas relaciones no son tan
inmed.^{atas} se afecta en alguna p.^{arte}
de este canal intestinal cuan-
to más

ta mas propension tendra á afe-
ctarse aquel organo que vive bajo
su mismo modo, & lo que es lo mis-
mo tienen un mismo modo de vi-
vir. ¿Acaso hay algun ente go-
bernad.^r que al momento que se
inflama una viciosa acuda al ins-
tante á poner una barrera impo-
netrable á la causa morbifica, para
q.^{ue} no interese á las otras partes q.^{ue}
no pueden vivir en estado fisiolo-
gico sin el auxilio de la g.^l pa-
rece? Tal vez se me dirá la vita-
lidad que gozan los mismos orga-
nos se opone á que el mal se
desarrolle lo que nadie negará,
¿mas esta vitalidad depende del
admirable conjunto, regular y
conforme uso de las partes y
funciones que constituyen

la economía animal viviente, o es
Algum ente q^e existe p^r si^{ng}lamente
si, sin necesidad de relaciones con
una parte grossera y que han de
perecer. Atqui mi imag.ⁿ se ofusca
y no hacienda a discurrir, sin embar-
go un dicho celebre entre los filo-
sofos se me presenta, nihil est
in intellectu quod prius non fuerit
in sensu. Ahora bien si es indigen-
table sentir para q^e haya idea,
y esta sensación se verifica p^r
medio de los organos dispuestos
a este fin; por q^e quitados estos
no se ejercen las mismas fun-
ciones, ¿claro es, por que no exis-
ten los agentes u organos que
desempeñaban aquella función.
Suego si el organo que esto
dispuesto a ejercer las funciones

digestivas no está en estado normal que se halla alterado, aquellas funciones secundarias deben disfrutar de la misma alterac.^{ón}, en este estado todos los resultados son malos y extraños, siendo así el organismo se deteriora se consume y finalmente perece. Bien pudiera ser mas extenso en este particular si diere lugar tan limitado tiempo. Recorriendo aun q.^{ue} a la ligera el canal intestinal haré algunas reflexiones sobre las relaciones en sus padecim.^{tos}

La enteritis debe llamarse la atención p.^{or} es la af.^{cción} de un órgano cuyas funciones son tan esenciales para la absorción de la creon del quilo y sus relaciones tan estrechas ya por los resultados de sus operaciones, cuanto por que desarrolla simpatías con una glandula secretoria de un liquido sumamente útil para el

20
cumplim^{to} de la digestión y expulsión de
los excrementos. La inflamación de esta
porción del canal intestinal no solo se
puede decir tiene relac.^{on} con las partes in-
mediatas y vísceras con quienes tiene conec-
ción, sino que creo que no habrá un punto
por imperceptible que sea en el organismo vi-
viente q^e próxima o remotamente deje de te-
ner relaciones con este aparato; así es que
en sus padecim^{tos} se ve desarrollarse terri-
bles afecciones en otros órganos, aparatos
y aun sistemas que expondremos mejor
cuando hable de la diferencia sintomatoló-
gica de las fiebres. Concluyendo esta segunda
parte con la enfermedad de los intestinos
gruesos bien llamada colitis, rectitis o
las diferentes denominaciones que los más
celebres autores han dado a sus padeci-
mientos, cuyas relaciones me parecen ser
tan estrechas entre si que cualquiera af.
que consideremos nos demuestra esta ver-

dad. La disenteria, sus sintomas no solo
se demuestran en el organo primitivo
sino que a la vez parece lo
esta el tubo digestivo, la suciedad de
la lengua, el aborrecimiento de los alimentos,
la pertinaz obstruccion del vientre, dia
rea algunas veces q^{ue} fluye uno o dos
dias despues el tenesmo, los retortijones
la constriccion continuada del recto y
un ardor molestisimo en el ano, tambien
hay otras afecciones denominadas colico
plumbico o saturnino, colico ileo nervioso
con vólvulo o muerere que seria dema
siado molesto traer aqui sus terribles
resultados. ¿ Por ventura las causas
que producen estos males se implan
tan inmediate sobre el organo que se
presenta ^{primitivo} ~~humano~~ afecto o habran pa
sado p^{or} otros organos cuyas fun
ciones no hayan sufrido alteracion
alguna, es acaso el tubo digestivo
en este y sin vida para que aque

Una causa destructora no obra su efecto uno en una p.^{te} determinada dejando intactas las demas por donde ha pasado y ha estado en contacto? Otro talento mas despejado que el mio resolverá mejor este enigma que me es tan difícil, maxime oyendo decir a los celebres autores de Patología que hay enfermedades que afectan a la vez toda la ^{vici inveteran} economía, estando convencido de la mutua dependencia que tienen entre sí todas las partes q^e la componen.

Solo me resta hablar de las razones mas probables sobre la diferencia sintomatologica de las llamadas fiebres. Esta ultima parte de mi prog.^{no} q^e tan extensa es daré una sucinta idea de ella exponiendo lo q^e en mi opinion siento, ya se ha ventilado en los anteriores con

tamen es cuan vaga es esta voz y cuan
 diferente su significado, pues creo no ha
 bra persona medianamente instruida en esta fa-
 cultad que crea se den fiebres esenciales
 segun los antiguos las conocian; Tener por
 causa lo que era efecto y poner una enfer-
 medad en el aire, vulgarmente hablando, bien
 satisfechos de que la fiebre es sintoma del
 padecimiento de este o aquel organo, y aña-
 to o sistema facilmente se deduce que la
 diferencia con q^{ue} se nos presenta este sinto-
 ma sera hija de la modificac.^{on} y anat.
 gica del organo, del modo de afectarse,
 y de las simpatias que desarrolla con
 aquellas partes que nos dan un cono-
 cimiento del padecimiento mas o menos posi-
 tivo seg^{un} la mayor influencia con
 q^{ue} se comunican aquellas sensacio-
 nes: juzgando nosotros las mas veces
 el mal por el modo de afectarnos
 los organos demostrativos de la

misma af.^{ta} Que recto y exacto es
menester fuera el Practico que precin
diendo del Sistema que le preocupa
de cualesq.^{ra} idea favorita que le con
duce a formar un juicio Erroneo ó fal
sa Indica.^{ta} y lo que es mas de su mis
mo amor propio; Examinare la afecc.^{ta}
bajo del punto de vista q.^{do} debia consi
derarla sin dejar atrás ni un apice á la
perfecta comprension; no olvidando
la causa del mal naturalera de la
parte que sufre, epoca, temper.^{to} idio
sincrasia, repugnancias, apetitos, cos
tumbres, regimen de vida, edad, sexo
cotac.^{ta} clima y afecciones morales,
mas así como los Facultativos que
ven un enfermo cada uno jénese
de su modo así tambien cada cual
le da el valor á un sintoma segun
el lo conoce, no como el sintoma
pueda ser en si; y mas si la par

te q. parece no se presenta a la sin-
ple vista, como es la cuestion presente:
Cuan varias ^{opiniones} ~~exposiciones~~ se agitan en
este particular, unos opinan por el
aspecto de la lengua, fisionomia, resp.^a
funciones asimilativas, secretorias y es-
cretorias; otros dando una preponderan-
cia extraordinaria al pulso, tales fue-
ron Solano de Lugue y Borden, otros
al dolor y otras varias anomalias que
llegan a nuestro conocimiento p.^a diferen-
tes medios y caminos: Tambien se obser-
ba en unos enfermos quejarse extra-
ordinariamente en una af.^{te} que otros
sufren con la mayor resignacion
llamando aqui la atencion de lo que
va arriba referido: asi es que si exami-
namos uno p.^a uno los sintomas que
describen la multitud de autores que
han descrito de fiebres; veremos pal-
pablemente q. juzgan p.^a el predomi-

nio de este o aquel sintoma denominaban la fiebre, sin atender los mas a el origen o causa de donde dimanaba. Observando pues con mas atencion los resultados de las nominadas fiebres p.^a infinidad de autopsias cadavericas se hallaron las huellas del padecimiento los organos afectados presentaban de practico anatomico, el sitio donde ha estado la enfermedad; si es verdad que algunos organos en el momento de faltar la vida parece no presentan alterac.^{on} alguna a la simple vista; pero inspeccionese bien y al tocarlos se vera con cuanta facilidad se desvanecen sus tejidos, y la poca cohesion de sus partes y en fin demuestra aquella falsa apariencia cotejandolos con otros organos en quienes no hay sospechas de haber padecido. Estos hechos confirman q.^{ue} estando localizada en un organo los sintomas q.^{ue} desarrolla dependen de esta modi-

St.
ficacion patologica e irradiaciones q^{da}
desembuelven. Describense por un momento
los sintomas mas notables de la calentura
inflamatoria, mucosa, dinamica, ataxi-
ca, critica, purpural, entero mesenterica &c.
y veremos que estan en varon directa de
estos ^{dos} preliminares. Siivamos de modelo
la llamada inflamatoria situando la in-
flamacion q^{da} la produce en la mucosa
gastro intestinal, (advertiendo que di-
cha fiebre tambien puede ser efecto del
padecim^{to} de otro organo) Prodromos, aun
cuando se presente esta fiebre sin ante-
cedentes no obstante preceden cansancio
gral, entorpecim^{to}, dolores bajos, desma-
yo, y perturbac.^{on} de la vista. Invasion,
suele presentarse esta calentura de re-
pente desde p.^{er} la manana hasta la
tarde, el enfermo experim^{ta} un horror
y estremecim^{to} grande breve y gral
en todo el cuerpo, sin horripilacion

siguiendo un calor suave. En el vigor de la enfermedad la lengua se presenta de un color blanco rojizo, sobre todo en sus bordes, boca seca de un gusto dulzacho sin amargor, sed ard.^{te} aborrecim.^{to} a los alimentos animales vientre hondo o suprimido, pulso lleno, fuerte, duro y frecuente algunas veces tambien blando y contraido. Las arterias carotidas y temporales latan con energia, se entumescen las venas y aun todo el cuerpo poniendose encarnado y en particular el rostro; la resp.^{ta} frecuente calida, ~~at~~ ~~trase~~ y a veces directam.^{te} atacada, transp.^{ta} abund.^{te} suave y halitosa, caloridad q.^l no incomoda y disminuye al tacto la orina al principio escasa y cargada presenta desp.^{ta} un sedimento blanco ligero y homogenco exquisita sensibilidad en los orga

nos q.^o invien a los sentidos de aqui los
ojos sentellecantes, vertigos de Oyato
tardo dolor de cabera vordo y gravativo
con propension al sueño, y delirio, siendo
aquel, un sopor perturbado con ensueños.
Las exaceruaciones no son muy bohemer
tes se presentan comun.^{te} al anocheacer
termina la enfermedad en un dia (efemera)
dos, tres, quatro, siete, nono, undecimo y
muchas hasta el catorce. El pronostico me
le sea favorable en cuyo caso proporciona
la crisis la epistaxis y otras evacuaciones de a
i toda esta numerosa colecc.^{on} de sintomas q.^o
se atribuyen a la calentura esencial aun
en la iconografia del celebre Pinel, que no
puede menos de confesar que en el vigor
de esta enfermedad se presenta a veces el
guna flemmasia? que nos demuestra? Los
Prodromos mismos ~~demuestran~~ indican
la causa de la antedicha fiebre, circunscri
biendonos en este momento a la mem
brana mucosa se vera la inmediata

relac.^{no} con el cerebro y coraron en el
efecto de los enunciados de mayos & a
Los demas sintomas que dimanen de la
circulac.^{no} sabidas con las intimas simpa-
ticas que tiene este con el coraron por
medio de los plexos nerviosos abdominales
pues el coraron recibe todas sus nervios
del gran simpatico asi es que basta una
impreesion fuerte de terror o un acto de
colera p.^a producir un sincope o una
apoplexia tambien es notorio que algu-
nos enfermos en el vigor de la enferme-
dad producen unos varonam^{to} de que
no eran capaces en el estado de salud
Mas aque son estos datos si solo basta
considerar q.^o su sistema lo apoyaban
en los humores y particularmte en la
sangre, i la sangre no es un pro-
ducto de otras funciones que modifi-
can los liquidos que ella en sus mo-
vim^{to} circulatorios suministra a

los solidos p.^o su nutricion, estando
abundada nutritiva L.^o o es la sangre
un liquido elemental, o un simple, que
no necesita de las infinitas preparacio
nes que sufren los liquidos g.^o para de
circular en ella, p.^o la asimilacion o
transmutacion, esto de suyo se ma
nifiesta si nos acordamos de la cir
culacion pulmonar y el quilo que el
canal toracico vierte en la vena cava
y otras varias circunstancias en que
patentemente se ve que sin organos
preparatorios no hay jugos nutri
tivos, siendo esto asi, es imposible
padescan estos sin que hayan sido
afectados aquellos que los elaboran.
erotorios son los experim.^{tos} que en
Francia se hicieron p.^o introducir
sangre vivificante en los enfermos
a que llamaron transfusion de
la sangre; ¿Cuales fueron los

resultados? Perecer los individuos q^l
se sugetaron a esta cirugía transfu-
soria, acometiendo desconvulsiones y
otros síntomas que muy bien demos-
traban que los líquidos necesitan
preparaciones particulares en la eco-
nomía p.^a identificarse o acomodar
al género de vida que en si tiene
cada órgano de los q^l la componen.

L. García Virrey

La Comisión nombrada p.^a sesionar la anterior Directo-
ción de D. Teodoro García Virrey sobre los resultados mu-
tuos de las Inflammaciones Gastro-intestinales, y las raso-
nes mas probables sobre la diferencia sintomatológica
de las llamadas Fiebres, es de dictamen se le oficie p.^a esta
M. Academia a su Autor estimulando a q^l continúe
en su aplicación p.^a utilidad de sus semejantes, y si lo veri-

fica se hacen dignos en algun tiempo de pertenecer a esta
Corporacion: Son ^{de} 10 de Junio de 1839

Don Antonio
Vilarguez Don Ramon Linares
del Ayuntamiento

